

نامه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	سؤالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲		سال سوم آموزش متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

ردیف	سؤالات	نمره
۱	با استفاده از اصل استقرای ریاضی، برای هر عدد طبیعی $n$ ، ثابت کنید: $P(n) : 1+2+ \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$	۱/۵
۲	در یک کلاس ۳۰ نفری حداقل چند دانش آموز در یک روز هفته متولد شده اند؟ چرا؟	۱/۲۵
۳	اگر $x$ عددی حقیقی و مثبت باشد، با استفاده از اثبات بازگشتی ثابت کنید:	۱/۲۵
۴	با استفاده از برهان خلف، نشان دهید اگر $n$ عددی فرد باشد، آنگاه $n$ نیز فرد است.	۱/۵
۵	مجموعه های $A = \{-1, 0, 2\}$ و $B = \{1, 3\}$ مفروضند: الف) $(A \times B)$ را به صورت زوج های مرتب بنویسید. ب) نمودار $(A \times B)$ را رسم کنید.	۱/۵
۶	مقادیر $x$ و $y$ را طوری بیابید که دو زوج مرتب $(x^3 - y^3, x^2 - y^2)$ و $(y - x, 15)$ با هم برابر باشند.	۱
۷	با استفاده از قوانین جبر مجموعه ها، ثابت کنید:	۱/۵
۸	رابطه $R$ روی $\mathbb{R}^2$ به صورت زیر تعریف شده است: $(x, y) R (z, t) \Leftrightarrow (y - t) = 3(x - z)$ الف) نشان دهید که $R$ یک رابطه هم ارزی است. ب) کلاس هم ارزی $\{(2, 3)\}$ را مشخص کنید.	۱/۵
۹	تمام ترکیبات دورقمی بدون تکرار، مجموعه اعداد $\{1, 2, 3\}$ را روی کارت های مختلف نوشته ایم (هر ترکیب روی یک کارت)، یک کارت را به طور تصادفی خارج می کنیم مطلوب است: الف) فضای نمونه ای ب) پیشامد $A$ که در آن عدد روی کارت زوج باشد. ج) پیشامد $B$ که در آن روی کارت عددی اول باشد.	۲
	ادامه سوالات در صفحه دوم «	

نامه تعالی

سال سوم آموزش متوسطه	رشته‌ی: ریاضی فیزیک	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>			

سوالات

ردیف

ردیف	سوالات	ردیف	ردیف
۱۰	نقاطه‌ای به تصادف درون مربعی به ضلع ۲ واحد در نظر می‌گیریم، مطلوب است احتمال آن که فاصله آن نقطه از هر راس مربع بیشتر از $\frac{1}{2}$ باشد.	۱/۵	
۱۱	تاس سالمی را ۵ بار پرتاب می‌کنیم مطلوب است احتمال آن که ۳ بار عدد زوج بیاید.	۰/۷۵	
۱۲	سه دونده $A$ و $B$ و $C$ با هم مسابقه می‌دهند، اگر احتمال برد $A$ با $B$ برابر باشد و احتمال برد هر کدام از آنها ۲ برابر بود $C$ باشد، احتمال آنکه $B$ یا $C$ برنده شود چقدر است؟	۱/۲۵	
۱۳	از مجموعه $\{A = 1, 2, \dots, 1000\}$ عددی به تصادف انتخاب می‌کنیم. احتمال این که عدد انتخابی بر ۳ و یا بر ۵ یا بر هر دو بخش پذیر باشد چقدر است؟	۲	
۱۴	برای دو پیشامد $A$ و $B$ از فضای نمونه‌ی $S$ اگر $A \subseteq B$ ثابت کنید: $P(B - A) = P(B) - P(A)$	۱/۵	
	« موفق باشید »	۲۰	جمع نمره

**با اسمه تعالی**

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال	ساعت شروع: ۱۰ صبح تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	رشته: ریاضی فیزیک
سال سوم آموزش متوسطه		
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطبلان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	$P(1) : 1 = \frac{1(1+1)}{2} \Rightarrow 1 = 1 \quad (0/25)$ $P(K) : 1+2+3+\dots+k = \frac{k(k+1)}{2} \quad (\text{فرض استقراء}) \quad (0/25)$ $P(K+1) : 1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (\text{حكم استقراء}) \quad (0/25)$ $P(K+1) : 1+2+3+\dots+k+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)+2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (0/25)$	۱/۵
۲	اگر ۳۰ نفر دانش آموز به منزله کبوتران و روزهای هفتہ به منزله لانه ها باشند (۰/۲۵)	۱/۲۵
۲	$\frac{30}{28} \rightarrow 4+1=5 \quad (0/0)$ بنا به اصل لانه کبوتری حداقل ۵ نفر از دانش آموزان در یک روز هفتہ متولد شده اند. (۰/۵)	۱/۲۵
۳	$x + \frac{1}{x} \geq 2 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 2x \Rightarrow x^2 - 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 \geq 0 \quad (0/5)$ درستی عبارت بدیهی است. بنابراین تمامی روابط برگشت پذیر است. (۰/۲۵)	۱/۲۵
۴	فرض می کنیم $n$ فرد نباشد پس زوج است (فرض خلف) (۰/۵) $n = 2k \Rightarrow n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2(2k^2) = 2k' \quad (0/5)$ به تناقض رسیدیم پس فرض خلف باطل و حکم صحیح است. (۰/۵)	۱/۵
	«ادامه در صفحه ی دوم»	

**باسمہ تعالیٰ**

ساعت شروع : ۱۰ صبح

رشته: ریاضی فیزیک

جبر و احتمال

تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲


سال سوم آموزش متوسطه

مرکز سنجش آموزش و پژوهش  
<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

الف)  $A \times B = \{(3, 2)(3, 0)(3, -1)(1, 2)(1, 0)(1, -1)\}$  (./ ۷۵)



۱/۵

۰

$$\begin{cases} x^r - y^r = 15 \Rightarrow (x - y)(x + y) = 15 \\ x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow 3(x + y) = 15 \Rightarrow x + y = 5 \quad (./ ۵)$$

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 3 \end{cases} \Rightarrow x = 4, y = 1 \quad (./ ۲۵) \quad (./ ۲۵)$$

۱

۱

$$A - (A \cap B) = A \cap (A \cap B)' = A \cap (A' \cup B') = (A \cap A') \cup (A \cap B') = \quad (./ ۲۵) \quad (./ ۲۵) \quad (./ ۲۵)$$

۱/۵

۷

$$\Phi \cup (A \cap B') = (A \cap B') = (A - B) \quad (./ ۲۵) \quad (./ ۲۵) \quad (./ ۲۵)$$

$$(x, y) R (z, t) \Leftrightarrow (y - t) = ۳(x - z)$$

$$1) (x, y) R (x, y) \Rightarrow (y - y) = ۳(x - x) \quad (./ ۲۵)$$

$$2) (x, y) R (z, t) \Rightarrow (y - t) = ۳(x - z) \Rightarrow (t - y) = ۳(z - x) \Rightarrow (z, t) R (x, y) \quad (./ ۲۵)$$

$$3) \left\{ \begin{array}{l} (x, y) R (z, t) \Rightarrow (y - t) = ۳(x - z) \\ (z, t) R (e, f) \Rightarrow (t - f) = ۳(z - e) \end{array} \right\} \Rightarrow y - t + t - f = ۳(x - z) + ۳(z - e) \Rightarrow$$

$$(y - f) = ۳(x - e) \Rightarrow (x, y) R (e, f)$$

تعدی (۰/۲۵)

پس رابطه  $R$  هم ارزی است (./ ۲۵)


ب

$$[(2, 3)] = \{(x, y) \in R^r \mid (x, y) R (2, 3)\} = \{(x, y) \mid y - 3 = ۳(x - 2) \Rightarrow y = ۳x - 3\} \quad (./ ۵)$$

"ادامه در صفحه سوم"

با اسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال
تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲	سال سوم آموزش متوسطه	
دانش آموزان وزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهر یور ماه سال ۱۳۹۲ <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	<p>(الف) <math>S = \{12, 13, 21, 31, 23, 32\}</math> (۰/۵)</p> <p>(ب) <math>A = \{12, 32\}</math> (۰/۷۵)</p> <p>(ج) <math>B = \{13, 31, 23\}</math> (۰/۷۵)</p>	۲
۱۰	<p>در چهار گوشه مربع چهار ربع دایره به شعاع <math>\frac{1}{2}</math> و به مرکز راس های مربع داریم که دایره ای به شعاع <math>\frac{1}{2}</math> را تشکیل می دهند: (۰/۵)</p>  <p><math>a_S = 2 \times 2 = 4</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>a_A = 4 - (\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \pi) = 4 - \frac{\pi}{4}</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>P(A) = \frac{a_A}{a_S} = \frac{4 - \frac{\pi}{4}}{4} = \frac{16 - \pi}{16}</math> (۰/۵)</p>	۱/۵
۱۱	<p><math>p(A) = \frac{\binom{5}{3}}{2^5} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}</math> (۰/۲۵)</p> <p>(۰/۵)</p>	۰/۷۵
۱۲	<p><math>P(C) = x</math></p> <p><math>p(A) = p(B) = 2x</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>P(A) + P(B) + P(C) = 1 \Rightarrow 2x + 2x + x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{5} \Rightarrow P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{2}{5}, P(C) = \frac{1}{5}</math> (۰/۲۵)</p> <p><math>P(B \cup C) = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}</math> (۰/۵)</p>	۱/۲۰
	«ادامه در صفحه چهارم»	

**باسمہ تعالیٰ**

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس: جبر و احتمال	ساعت شروع: ۱۰ صبح	رشته: ریاضی فیزیک
تاریخ امتحان ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۲		سال سوم آموزش متوسطه
مرکز سنجش آموزش و پژوهش <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان ازاد سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۲

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	<p>اگر <math>A</math> پیشامد بخش پذیر بودن عدد انتخابی بر ۳ و <math>B</math> پیشامد بخش پذیر بودن عدد انتخابی بر ۵ باشد آنگاه:</p> $\left. \begin{array}{l} P(A) = \frac{333}{1000} \quad (0/5) \\ P(B) = \frac{200}{1000} \quad (0/5) \\ P(A \cap B) = \frac{66}{1000} \quad (0/5) \end{array} \right\} \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (0/25)$ $P(A \cup B) = \frac{333}{1000} + \frac{200}{1000} - \frac{66}{1000} = \frac{467}{1000} \quad (0/25)$	۲
۱۴	<p>می دانیم <math>(0/25) B = (B - A) \cup A</math>  <math>(0/5) A \cap (B - A) = \emptyset</math> (دوپیشامد از هم جدا هستند زیرا):          بنابراین:</p> $P(B) = P(B - A) + P(A) \quad (0/25) \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A) \quad (0/5)$	۱/۵

مصححین گرامی لطفاً برای راه حل های صحیح دیگر هم به تناسب نمره منظور فرمایید.